IMPRILAIS, IMPRIMACION ESPECIAL PARA RELAIS

Descripción

Imprimación soluble en agua, concebida para asegurar la buena adherencia del RELAIS a base de resinas sintéticas de alta calidad en dispersión acuosa y cargas especiales.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como imprimación para asegurar la correcta adherencia de nuestro revestimiento plástico RELAIS. Puede ser aplicada tanto sobre superficies nuevas como superficies pintadas previa preparación. Utilizado en la capa de acabado del sistemas SATE.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo y partículas sueltas, presentándose compacta, seca o ligeramente húmeda.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envase antes de usar.
Aplicar con brocha o rodillo.
Diluir en agua, hasta en un 50% (máximo) y aplicar sólo una mano.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Dejar transcurrir 8 horas (mínimo) antes de aplicar el RELAIS.
-No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, heladas o con cualquier circunstancia meteorologica adversa.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad1,67 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosidad50.000 +- 10.000 mPa.s

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Seco para repintar8 horas a 20ºC

Color/esBlanco, crema, marrón claro y oscuro, gris, limón y verde.

Rendimiento

10 m2 por kg y por mano.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P273:Evitar su liberación al medio ambiente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.